

Consideraciones generales



- Mientras esté la aguja debe evitar moverse.
- La radiación no se ve, no se siente y no duele.
- No quedará contaminado con radiación con este procedimiento. No se asuste.

¿Qué molestias pueden presentarse después de la braquiterapia?

• Dolor local.

• Moretones leves, inflamación y/o sangrado escaso en la zona de inserción de las agujas.

• Alteración de las pruebas hepáticas (en algunos casos).

• Molestias de la sedación (náuseas vómitos, somnolencia).

Las molestias varían en cada persona y puede que no tenga ninguna.

Teléfono: 2 2575 7264
Email: braquiterapia@incancer.cl

Educación de braquiterapia sobre metástasis guiada por imágenes



Equipo de Enfermería
CR Radioterapia

¿Qué es la braquiterapia sobre metástasis guiada por imágenes?

- Es un tratamiento localizado.
- Se utiliza radiación o energía.
- La energía entra en contacto con el tumor (metástasis) a través de un dispositivo o aguja(s).

¿Cuáles son las indicaciones para realizar el procedimiento?



- Realizar exámenes solicitados.
- Ayuno de ocho (08) horas.
- Firmar el consentimiento informado.
- Hospitalización.
- No asistir con prótesis dental.
- No traer objetos de valor.
- Traer 2 donantes al momento de la hospitalización.
- Hipertensos tomar medicamentos con poca agua.
- Diabéticos (suspender)
- Debe asistir acompañado.
- Asistir sin pintura de uñas.

Una vez ingresado y vestido con una bata se le colocará en una camilla y se procederá a:

- Instalar una vía venosa.
- Monitorizar signos vitales.
- Instalar sonda Foley (sólo en algunos casos).
- Trasladar a scanner (TAC).



¿Cómo se realiza el procedimiento?

- 1- El TAC sirve para corroborar ubicación de aguja(s).
- 2- Luego regresa a braquiterapia y espera con agujas puestas entre 45 a 60 minutos aprox.
- 3- El tratamiento de una sesión, en algunos casos particulares se puede dividir en dos.
- 4- El paciente se traslada a hospitalización.

