

Braquiterapia intersticial en cáncer de próstata



¿Qué es la Braquiterapia?

Es un tratamiento que utiliza radiación ionizante (alta energía) cerca o dentro de un tumor en forma localizada.

¿Para qué se utiliza la braquiterapia en el cáncer de próstata?

- Como tratamiento exclusivo. En este caso se utilizan cuatro sesiones de braquiterapia separadas de 6 horas cada una ó
- Como tratamiento complementario a la radioterapia externa. Puede utilizarse antes o después de ésta. En este caso serán dos sesiones de braquiterapia, separadas de 6 horas cada una.

¿En qué consiste el procedimiento para realizar braquiterapia?

Se necesita la instalación de un implante que va a través del periné hasta la próstata. Luego este implante se conecta por unos cables especiales a la máquina de braquiterapia para poder entregar la radiación a la zona.

También necesitará una sonda urinaria la cual se mantendrá hasta que se retire el implante.

¿Cómo es el implante que va a la próstata?

Es un cuadrado con orificios, donde se colocarán una serie de agujas largas (alrededor de 15 a 20 dependiendo de cada persona).

¿Duele instalar el implante con agujas?

No. El procedimiento se realiza con anestesia, por lo que no sentirá dolor. Una vez finalizada la anestesia puede sentir molestias y/o dolor leve en la zona, para lo cual se le administrará tratamiento farmacológico.

¿Cuáles son las indicaciones o requisitos para poder realizar el procedimiento?


- ✓ Firmar el consentimiento informado del tratamiento.
- ✓ Deberá realizarse exámenes de sangre, orina y electrocardiograma si corresponde.
- ✓ El día del procedimiento deberá estar con un ayuno de 8 horas.
- ✓ Debe suspender el uso de aspirina con anticipación.
- ✓ La noche anterior deberá realizar un fleet enema rectal.
- ✓ Deberá presentarse con ducha completa realizada el mismo día.
- ✓ No debe asistir con objetos de valor. Debe retirarse la prótesis dental (si usa).

¿Qué molestias pueden presentarse con el retiro del implante?

Varían entre cada persona, van desde que no sienta mayores molestias hasta presentar:

- Dolor o molestias en la zona.
- Inflamación en el periné.
- Equimosis o moretones en la zona.
- Otras que su médico le indique.

No se asuste. Se le realizará control telefónico al día siguiente del alta y luego tendrá control médico a la semana.



© Healthwise, Incorporated

Cualquier duda comunicarse
a los teléfonos:

25757266 Secretaria

25757264 Braquiterapia

Correo: braquiterapia@incancer.cl