

Amoxicilina/Acido Clavulánico

875/125 mg



1. ¿Para qué es este medicamento?

Es utilizado para el tratamiento de diversas infecciones bacterianas, encargándose de causar la muerte del microorganismo. Su utilidad es diversa, siendo empleado como profilaxis, algunos tipos de meningitis, amigdalitis, etc. Se encuentra asociado con ácido clavulánico, cuya función es evitar que las bacterias destruyan la amoxicilina. Por lo que, su uso siempre debe estar guiado por su médico de cabecera.

2. ¿Cómo se administra?

Por vía oral (comprimido/cápsula), donde la cantidad que deberá administrar, dependerá de lo establecido por su médico oncólogo y su condición clínica.

3. ¿Qué debo saber antes de administrar este medicamento?

- ➔ Es importante tomar la amoxicilina exactamente como lo haya indicado su médico, por lo que debe seguir las instrucciones de dosificación.
- ➔ Debe ser administrado 30 a 60 minutos después de las comidas y procurando a la misma hora todos los días.
- ➔ En caso de presentar alguna erupción cutánea (brotes rojos y con picazón) o lesiones en mucosa, deberá suspender inmediatamente el medicamento e informar a su médico.
- ➔ Recuerde que para que estos medicamentos sean exitosos deben cumplir obligatoriamente los días de tratamiento. Por lo que, NO debe suspender el tratamiento hasta completar el esquema indicado por su médico, a pesar de que ya no presente los síntomas.
- ➔ Recuerde que NO debe tomar amoxicilina como prevención de una infección, dicha acción le podría generar bacterias resistentes a los antibióticos, conllevando tratamientos más complejos y costosos.

4. ¿Qué tengo que hacer si me olvido tomar una dosis?

Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la siguiente dosis, deje pasar la que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. Y recuerde que solo debe administrarse el fármaco en caso de presentar los síntomas descritos.

5. ¿Dónde almacenar el medicamento?

- ✓ Debe mantenerse en su envase original protegido del calor, luz y humedad.
- ✓ Se recomienda dejarlo en un cajón de ropa, en caso de no disponer un botiquín. (Recuerde que éste no debe ser almacenado en el baño ni en la cocina).

6. ¿Qué otros efectos puede provocar la Amoxicilina/Acido Clavulánico?

- **Diarrea:** su aparición es de mediana frecuencia, por lo que es importante mantenerse hidratado y comunicar cualquier cambio en la frecuencia o consistencia de las deposiciones al médico.
- **Cefalea/dolor de cabeza:** su aparición no es tan común, pero puede ser controlada con diferentes medicamentos, tales como paracetamol.
- **Urticaria (sarpullido):** su aparición depende del paciente, por lo que si se presenta deberá suspender el medicamento e informar a su médico tratante.